

Vogelreis

Noord Griekenland

30 april tot en met 07 mei 2016

1. **Geoorde fuut** (*Podiceps nigricollis*), één waarneming van enkele koppeltjes in de omgeving van de Nestos delta.
2. **Fuut** (*Podiceps cristata*), overal te spotten in de geschikte biotopen, maar in ongelofelijke aantallen aanwezig op het Kerkinimeer, werkelijk honderden, zo niet duizenden exemplaren.
3. **Dodaars** (*Tachybaptus ruficollis*), op elk zichzelf respecterend waterplasje aanwezig.
4. **Roze pelikaan** (*Pelicanus onocrotalis*), zeer talrijk in de omgeving van het Kerkinimeer, mooie erg nabije waarnemingen van zwemmende, foeragerende en vliegende vogels.
5. **Kroeskoppelikaan** (*Pelicanus crispus*), overal aanwezig in de omgeving van het Kerkinimeer vermoedelijk wat minder talrijk dan de Roze Pelikaan, maar met even mooie waarnemingen.
6. **Aalscholver** (*Phalacrocorax carbo*), zowat overal te zien in de buurt van water, maar de aantallen op het Kerkinimeer waren meer dan indrukwekkend, het was een machtig schouwspel om duizenden aalscholvers samen met de twee pelikaansoorten gezamenlijk te zien jagen op de visrijke wateren van het meer.
7. **Kuifaalscholver** (*Strictocarbo aristotelis*), één vrij verre, maar duidelijke waarneming op zee, dit in de omgeving van de Nestos delta.
8. **Dwergaalscholver** (*Microcarbo pygmeus*), overal aanwezig in de geschikte biotopen, massaal vertegenwoordigd op het Kerkinimeer.
9. **Woudaap** (*Ixobrychus minutus*), talrijk in de omgeving van het Kerkinimeer, je ziet ze daar werkelijk overal over het riet vliegen. Tijdens een korte wandeling langsheen één van de vele afvoerkanalen van het meer werden een viertal vogels opgestoten, eentje liet zich van op korte afstand langdurig bewonderen.
10. **Kwak** (*Nycticorax nycticorax*), talrijk rond het Kerkinimeer, zowel in zit, vliegend als foeragerend waargenomen.
11. **Ralreiger** (*Ardeola ralloides*), overal bij water aanwezig, maar bijzonder talrijk in de omgeving van het Kerkinimeer, erg nabije waarnemingen van rustende, vliegende en foeragerende vogels.
12. **Kleine zilvreiger** (*Egretta garzetta*) overal aanwezig waar geschikt biotoop voorhanden.

13. **Grote zilverreiger** (*Casmerodius albus*) talrijk in de geschikte biotopen, zij het minder algemeen dan vorige soort.
14. **Blauwe reiger** (*Ardea cinerea*) vermoedelijk de talrijkste reigersoort, een spectaculaire waarneming in de omgeving van het Kerkinimeer, waar een vogel een slang te pakken kreeg, deze minutenlang met de snavel bewerkte, waarna de toch bijna 1 meter lange slang alsof het een paling was, gewoon naar binnen gleed.
15. **Purperreiger** (*Ardea purpurea*), vrij algemeen, overal aanwezig in de geschikte biotopen.
16. **Ooievaar** (*Ciconia ciconia*), talrijk, zowel broedende als foeragerende vogels. Waar landbouwers hun velden omploegden waren ze in de kortste keren massaal aanwezig.
17. **Zwarte ooievaar** (*Ciconia nigra*), dagelijks wel een aantal waarnemingen, één exemplaar werd juist voor onze auto opgestoten, ergens midden in een bos, waar de vogel blijkbaar nestmateriaal verzamelde.
18. **Zwarte ibis** (*Plegadis falcinellus*), erg goed vertegenwoordigd aan de moerasachtige plassen (punten 19/20) in de omgeving van de Evros delta, groepen van 10-tallen exemplaren waren geen uitzondering.
19. **Lepelaar** (*Platalea leucorodia*), regelmatig waargenomen zowel foeragerend, rustend en vliegend, dit telkens in de daartoe geschikte terreinen.
20. **Flamingo** (*Phoenicopterus roseus*), Een vrij grote groep van ongeveer 25 vogels in de zoutpannen van Porto Lagos, waarvan één jonge vogel vrij dichtbij en een 20-tal exemplaren in de Kalohori Lagoon nabij Thessaloniki.
21. **Knobbelzwaan** (*Cygnus olor*), Op meerdere plaatsen in de geschikte biotopen aanwezig.
22. **Grauwe gans** (*Anser anser*), Enkel waargenomen in de omgeving van het Kerkinimeer, daar zeker niet zeldzaam, groepen van enkele tientallen vogels heel normaal.
23. **Bergeend** (*Tadorna tadorna*), meerdere waarnemingen in diverse gebieden, zowel in de omgeving van zoet- als in de buurt van zout water.
24. **Wilde eend** (*Anas platyrhynchos*), overal waar waterpartijen aanwezig kon je deze soort wel waarnemen.
25. **Krakeend** (*Anas strepera*) enkele zeer mooie waarnemingen op en rond de moerasachtige wateren in de omgeving van de Evrosdelta (punten 19 en 20), algemeen daar.
26. **Pijlstaart** (*Anas acuta*), zelfde opmerking als hierboven.
27. **Slobeend** (*Anas clypeata*), meerdere waarnemingen in de voor deze vogel geschikte biotopen.
28. **Zomertaling** (*Anas querquedula*), mooie erg nabije waarnemingen van een 5- tal koppeltjes op de moerasachtige ondiepe wateren van punten 19/20 in de omgeving van de Evros delta.
29. **Tafeleend** (*Aythya ferina*), slechts eenmaal waargenomen in de omgeving van de Evros delta.

30. **Witoogeend** (*Aythya niroca*) tientallen exemplaren aanwezig op de moerasachtige plassen in de omgeving van de Evros delta.
31. **Vale Gier** (*Gyps fulvus*), regelmatige waarnemingen in de buurt van Dadia forest, op de bekende gierenvoederplaats waren ze echter niet aanwezig.
32. **Monniksgier** (*Aegypius monachus*), één waarneming van een hoog overkomende vogel dit in de buurt van het Dadia infocenter, later een prachtige waarneming van 2 vrij laag overvliegende vogels ergens onderweg, maar in de buurt van Dadia.
33. **Aasgier** (*Neophron percnopterus*), mooie waarnemingen van een koppelend paartje op de gekende gierenvoederplaats in Dadia.
34. **Zeearend** (*Haliaeetus albicilla*), geen al te nabije, maar toch twee prachtige waarnemingen van deze massieve indrukwekkende roofvogel nabij de punten 19/20 in de buurt van de Evrosdelta.
35. **Steenarend** (*Aquila chrysaetos*), een ongelooflijke prachtige, langdurige waarneming van één over onze hoofden zeilende vogel in de omgeving van Dadia (punt 4). Al de kenmerken uit het boek konden zo op deze waarneming worden geplakt, wellicht één van de mooiste observaties van gans de trip.
36. **Oostelijke keizersarend** (*Aquila heliaca*), slechts één waarneming in de Evrosdelta, een subadulte vogel zittend op de top van een elektriciteitspaal. Langdurige telescoopwaarneming, de grootte van deze vogel kon pas worden vergeleken, toen een ekster die hem voortdurend zat te plagen, samen met hem in beeld kwam, de ekster leek dan niet groter dan een mus. Waarschijnlijk moe geplaagd vloog de vogel enige tijd later weg, daarbij opnieuw zijn indrukwekkende massa tonend.
37. **Schreeuwarend** (*Aquila pomarina*), prachtige waarnemingen van deze soort, eenmaal in de omgeving van Dadia punt 4, een koppeltje dat boven onze hoofden zeilde en zich zo enige tijd liet bewonderen, tweemaal een fraaie, zij het verre waarnemingen van een jagende vogel boven het Kerkinimeer en één onvergetelijke waarneming van een door de auto opgestoten vogel, die vervolgens op minder dan 30 meter van ons op een richel ging zitten en zich toen ongestoord liet bekijken en filmen!
38. **Slangenarend** (*Circeatus gallicus*), wel meerder waarnemingen gedurende de trip, meestal jagende vogels. Eén waarneming van twee, op de top van een rots rustende vogels, deze konden langdurig door de telescoop worden bekeken.
39. **Dwergarend** (*Hieraetus pennatus*), slechts enkele zij het mooie waarnemingen, telkens van de lichte fase, eenmaal in de Dadia omgeving en eens in de buurt van Mount Vrontou.
40. **Zwarte wouw** (*Milvus migrans*), slechts één, zij het mooie waarneming van deze soort in de omgeving van het Kerkinimeer, waarschijnlijk was deze, daar toch vrij algemene soort nog niet helemaal terug van zijn overwinteringsgebied.
41. **Bruine kiekendief** (*Circus aeruginosus*), zeer algemene roofvogel in het noorden van Griekenland, vrijwel overal waar te nemen, dit zowel in de buurt van water als op de aanwezige uitgestrekte akkers.

42. **Blauwe kiekendief** (*Circus cyaneus*), één vrouwtje jagend over een akker in de buurt van de punten 41/42 nabij Porto Lagos.
43. **Grauwe kiekendief** (*Circus pygargus*), een jagende man, die zich uitvoerig liet bewonderen, in de buurt van de Evros delta.
44. **Arendbuizerd** (*Buteo rufinus*), maar één zekere waarneming van deze soort, hierbij waren wel al de nodige kenmerken goed waar te nemen, dit gebeurde in de buurt van de viskwekerijen (punten 45-47) in de buurt van Porto Lagos.
45. **Buizerd** (*Buteo buteo*), vrij algemene soort, dagelijks waargenomen in diverse biotopen.
46. **Steppenbuizerd** (*Buteo buteo ssp. vulpinus*), ook deze soort (ondersoort) werd dagelijks waargenomen, vermoedelijk is deze ondersoort daar talrijker dan de nominaat.
47. **Sperwer** (*Accipiter nisus*), slechts één zekere waarneming, dit van een zeilende vogel in de buurt van Dadia dorp.
48. **Balkansperwer** (*Accipiter brevipes*), ook van deze soort maar één zekere waarneming, een boven onze hoofden zeilend exemplaar, de zwarte vleugelpunten waren opvallend. De soort werd gespot in de buurt van Dadia dorp.
49. **Havik** (*Accipiter gentilis*) slechts één waarneming van een zwevende vogel in de buurt van punten (80-81-82) aan de westkant van Kerkini.
50. **Torenvalk** (*Falco tinnunculus*), redelijk algemeen, dagelijks wel een aantal waarnemingen van deze bij ons zo sterk achteruit gaande soort.
51. **Kleine torenvalk** (*Falco naumanni*), de beste waarnemingen van deze soort gebeurden vanuit de auto tijdens onze rit van de luchthaven naar het oosten van het land. Regelmatig werden hier en daar een aantal vogels gespot, ofwel zittend op de elektriciteitsdraden, of jagend. Vermoedelijk ook een jagende groep in de buurt van het Kerkinimeer.
52. **Roodpootvalk** (*Falco vespertinus*), deze soort trekt vrij massaal door in Griekenland, daardoor werden er ook door ons nogal wat van deze vogels gezien. Meestal met enkele bij elkaar, jagend of rustend op de aanwezige elektriciteitsdraden.
53. **Eleonora's valk** (*Falco eleonora*), één exemplaar (wsl. donkere fase) zittend in een boomtop, daarna in een explosieve snelle vlucht verdwijnend. Deze waarneming vond plaats in de Evros delta, op slechts enkele honderden meters van de kust.
54. **Boomvalk** (*Falco subbuteo*), één jagend exemplaar in de Evros delta, en waarschijnlijk één exemplaar jagend tussen enkele roodpootvalken in de omgeving van het Kerkinimeer.
55. **Slechtvalk** (*Falco peregrinus*), mooie en langdurige waarneming van een adulte vogel zittend midden op een akker in de aanloop naar de Evros delta.
56. **Patrijs** (*Perdix perdix*), enkele vogels die in de verte een zandpad overstaken, in de buurt van de Evros delta, de dag erna enkele vogels nabij de zoutpannen van Porto Lagos.

57. **Waterhoen** (*Gallinula chloropus*), zeker niet op elke waterplas aanwezig, maar waar aanwezig algemeen.
58. **Meerkoet** (*Fulica atra*), zeer algemeen, overal waar water, was deze soort wel te vinden.
59. **Scholekster** (*Haematopus ostralegus*), zeer algemeen, overal aanwezig waar water in de buurt.
60. **Kluut** (*Recurvirostra avosetta*), mooie aantallen in de zoutpannen en moerasachtige stroken nabij Porto Lagos (punten 38-40), ook sterk vertegenwoordigd in de overstromingsgebieden van de Kalohori lagoon nabij Thessaloniki.
61. **Steltkluut** (*Himantopus himantopus*) overal aanwezig in de geschikte biotopen, in de Kalohori Lagoon nabij Thessaloniki in vrij hoge aantallen aanwezig.
62. **Griël** (*Burhinus oedipnemos*), een viertal exemplaren in de omgeving van de zoutpannen van Porto Lagos (punten 38-40).
63. **Vorkstaartplevier** (*Glareola pratincola*), een viertal exemplaren in een moerasachtige omgeving in de buurt van punt 6, Porto Lagos. Een 14-tal (misschien wel meer) exemplaren op een akker, mooie erg nabije waarneming vanuit het busje, deze observatie gebeurde op weg naar ons hotel "Nefeli" in Alexandroupolis.
64. **Kleine plevier** (*Charadrius dubius*), overal aanwezig in de geschikte biotopen in het binnenland.
65. **Bontbekplevier** (*Charadrius hiaticula*), slechts één dag waargenomen, dit in de Porto Lagos omgeving, hier waren deze vogels in aantal vrij goed vertegenwoordigd.
66. **Strandplevier** (*Charadrius alexandrinus*), zowel in de Evros delta als in Porto Lagos goed vertegenwoordigd, ook aan de kust in de Kalohori Lagoon (nabij Thessaloniki) vrij goed vertegenwoordigd, daardoor de enige plevier te zien bij zoet als bij zout water.
67. **Zilverplevier** (*Pluvialis squatarola*), waargenomen in de Porto Lagos buurt en in de Kalohori lagoon, steeds maar enkele exemplaren en steeds bij zout water.
68. **Kievit** (*Vanellus vanellus*), slechts enkele waarnemingen van deze soort, deze verspreid over de Evros delta en Porto Lagos.
69. **Sporenkievit** (*Vanellus spinosus*), prachtige erg nabij waarnemingen van een viertal vogels in de Nestos Delta (punten 5, 6), de vogels lieten zich langdurig in zit en in de vlucht bewonderen. Verder nog minimum één exemplaar in de Drana lagune (Evros Delta).
70. **Drieteenstrandloper** (*Calidris alba*), een dertigtal exemplaren aan de kust (punt 3) aan de rand van de Evros delta, mooie waarneming van vogels in zomerkleed. Verder een tiental exemplaren in de Kalohori lagoon nabij Thessaloniki.
71. **Steenloper** (*Arenaria interpres*), waarnemingen van deze soort telkens nabij de zee, dit in de buurt van de Evros delta en in de nabijheid van Porto Lagos.
72. **Bonte strandloper** (*Calidris alpina*), een tiental exemplaren in de Kalohori lagoon nabij Thessaloniki.

73. **Krombekstrandloper** (*Calidris ferruginea*), zeer talrijk aanwezig op elke plas, zeereep of moerasachtig water. De meeste volop in zomerkleed, toch ook nog wel wat variatie in overgangskleden.
74. **Breedbekstranloper** (*Limicola falcinellus*), één zekere, zij het vrij verre waarneming in de nabijheid van de zoutpannen in Porto Lagos, één twijfelachtige waarneming in de Kalohori lagoon.
75. **Temmincks strandloper** (*Calidris temminckii*), een 10- tal vogels in de omgeving van de zeereep in Porto Lagos en enkele prachtige nabije waarnemingen van vogels in zomerkleed in de Kalohori lagoon.
76. **Kleine strandloper** (*Calidris minuta*), waarnemingen van een 20-tal vogels in de zelfde gebieden als Temmincks, ook van deze kleine strandlopers mooie nabije telescoop waarnemingen van vogels in zomerkleed.
77. **Bosruiter** (*Tringa glareola*), de meest algemene waadvogel, geen plasje was zo klein of er stond er wel eentje bij.
78. **Witgat** (*Tringa ochropus*), duidelijk veel minder talrijk dan bosruiter, meestal één of enkele exemplaren tussen de bosruiters, maar enkel op de grotere watermassa's.
79. **Oeverloper** (*Actitis hypoleucos*), enkele verspreide waarnemingen van deze soort, meestal vogels opgestoten tijdens één of andere wandeling.
80. **Tureluur** (*Tringa totanus*), overal in de geschikte biotopen wel enkele exemplaren aanwezig.
81. **Zwarte ruiter** (*Tringa erythropus*), enkele mooie waarnemingen van vogels in zomerkleed, dit telkens in de nabijheid van zout water.
82. **Groenpootruiter** (*Tringa nebularis*), ook van deze soort enkele mooie waarnemingen en ook hier in de buurt van zout water.
83. **Poelruiter** (*Tringa stagnatilis*) voor enkelen onder ons een vluchtige, maar duidelijke waarneming van deze slanke steltloper, dit in de buurt van Porto Lagos.
84. **Kemphaan** (*Philomachus pugnax*), zeer talrijk aanwezig in al de geschikte biotopen, tientallen vogels dit zowel in zomer- als in overgangskleed.
85. **Kokmeeuw** (*Croicocephalus ridibundus*), alhoewel nergens erg talrijk, toch wel dagelijks enkele waarnemingen.
86. **Dunbekmeeuw** (*Larus genei*), mooie waarnemingen van deze prachtige meeuw, er zaten er tientallen in de Kalohori lagoon nabij Thessaloniki.
87. **Stormmeeuw** (*Larus canus*), één waarneming van deze soort, dit aan de kust, in de buurt van de Nestos delta.
88. **Zwartkopmeeuw** (*Larus melanocephalus*), nogal wat waarnemingen van deze mooie meeuw, hun klagende roep was in de geschikte biotopen niet uit de lucht.
89. **Geelpootmeeuw** (*Larus michahellis*), zonder twijfel de talrijkste meeuw.

90. **Audouins meeuw** (*Larus audouinii*), een viertal eerste wintervogels in de Kalohori lagoon, lokte aanvankelijk nogal wat discussie uit. Mede geholpen door een goede lichtinval, een vrij nabije waarneming en de nodige literatuur, bleek het om deze meeuwensoort te gaan.
91. **Dwergmeeuw** (*Larus minutus*), mooie waarnemingen van dit mooie elegante meeuwtje, dit in meerdere gebieden zowel aan de kust als in binnenland.
92. **Dwergstern** (*Sterna albifrons*), geen zeldzaamheid in de geschikte gebieden.
93. **Grote stern** (*Sterna sandvicensis*), slechts één, maar duidelijke waarneming van enkele foeragerende vogels in de omgeving van de zoutpannen van Porto Lagos (punten 38-40).
94. **Lachstern** (*Gelochelidon nilotica*), prachtige en vrij langdurige waarneming van een foeragerende vogel boven de zoutpannen van Porto Lagos. Overigens in gezelschap van bovenstaande soort.
95. **Visdief** (*Sterna hirundo*), vrijwel dagelijks waargenomen, zelfs buiten de echt geschikte gebieden. Op een vlot in het Kerkinimeer broeden minstens een 50-tal koppels, deze zijn vanaf de oever mooi waar te nemen.
96. **Reuzenstern** (*Sterna caspia*), slechts één eerder korte waarneming dit ergens in de buurt van de Evros delta.
97. **Zwarte stern** (*Chlidonias niger*), algemene doortrekker, op de daartoe geschikte plaatsen overal wel te zien.
98. **Witvleugelstern** (*Chlidonias leucopterus*), algemene doortrekker en waarschijnlijk ook vrij zeldzame broedvogel, op alle geschikte plaatsen te zien, maar duidelijk in kleinere aantallen als de twee andere moerassterns.
99. **Witwangstern** (*Chlidonias hybridus*), meest waargenomen moerasstern, in aantallen beide anderen overtreffend, waarschijnlijk regelmatige broedvogel en talrijke doortrekker.
100. **Houtduif** (*Columba palumbus*), algemene soort, vrijwel overal waar te nemen.
101. **Turkse tortel** (*Streptopelia decaocto*), zeer algemene soort, overal waar te nemen.
102. **Zomertortel** (*Streptopelia turtur*), fijn om nog eens mooie aantallen te zien van deze prachtige, bij ons zo sterk achteruit gaande soort.
103. **Diamantduif** (*Geopelia cuneata*), aangename ontmoeting met dit uit Australië afkomstig mooi vogeltje. In de parken van Thessaloniki bleek dit duifje niet echt zeldzaam.
104. **Koekoek** (*Cuculus canorus*), algemeen, overal waar onderweg om één of andere reden eens werd gestopt werden we verwelkomd door het geroep van deze vogels.
105. **Kuifkoekoek** (*Clamator glandarius*), tijdens een korte wandeling werd een vogel opgestoten uit de struiken naast de weg, vooral de wat achtergebleven leden van de groep haalden daar hun voordeel uit omdat de vogel naast hen kwam doorgevlogen.
106. **Steenuil** (*Athene noctua*), vrijwel dagelijks wel één of twee waarnemingen van deze soort, meestal roestende vogels op daken of elektriciteitspalen.

107. **Dwergooruil** (*Otus scops*), minimum 5 roepposten in de omgeving van ons hotel (Sun Beach) in Thessaloniki. Eén van de vogels was zo vriendelijk op de top van een kale boom te poseren in het felle licht van een straatlamp.
108. **Gierzwaluw** (*Apus apus*), algemeen, elke dag meerdere waarnemingen.
109. **Vale gierzwaluw** (*Apus pallidus*), duidelijk aanwezig op de vlieghaven in Thessaloniki, elders nergens waargenomen.
110. **Alpengierzwaluw** (*Apus melba*), heel veel geluk gehad met deze soort, slechts één vogel gespot tijdens een korte rustpauze ingelast tijdens onze autorit naar Mount Vrontou.
111. **Hop** (*Upupa epops*), algemene soort, dagelijks wel enkele waarnemingen.
112. **Ijsvogel** (*Alcedo atthis*), in totaal een drietal waarnemingen, dit zoals te verwachten telkens in waterrijke gebieden.
113. **Bijeneter** (*Merops apiaster*), zeer algemeen, zowel doortrekkende als plaatselijke vogels in grote aantallen aanwezig.
114. **Scharrelaar** (*Coracias garulus*), bijna dagelijks wel waarnemingen van deze soort, meestal van op elektriciteitsdraden zittende vogels.
115. **Halsbandparkiet** (*Psittacula krameri*), helemaal niet zo zeldzaam in de parken en lanen van Thessaloniki.
116. **Groene specht** (*Picus viridis*), slechts enkele waarnemingen, deze telkens ergens in de buurt van Kerkini.
117. **Grijskopspecht** (*Picus canus*), één exemplaar luid roepend in de omgeving van Mount Vrontou. Ondanks al onze inspanningen kregen we de vogel niet zien.
118. **Grote bonte specht** (*Dendrocopus major*), eigenaardig genoeg slechts één, zei het mooie, waarneming, dit in de buurt van het Kerkinimeer.
119. **Syrische bonte specht** (*Dendrocopus syriacus*), twee prachtige waarnemingen van deze illustere soort. De eerste waarneming gebeurde toen we door een klein dorpje reden, waar een vogel tegen een houten telefoonpaal hing, toen deze wegvloog werd hij na enig zoeken terug gevonden in gezelschap van een partner. Een tweede waarneming in de buurt van het Kerkinimeer toonde ons een koppeltje nabij de nestholte.
120. **Veldleeuwerik** (*Alauda arvensis*), slechts enkele waarnemingen, dit meestal van hoog in de lucht zingende vogels.
121. **Kuifleeuwerik** (*Galerida cristata*), zeer algemeen, overal in de geschikte gebieden aanwezig.
122. **Boomleeuwerik** (*Lullula arborea*), slechts enkele waarnemingen, beide waarnemingen gebeurden steeds op wat hoger gelegen terreinen.
123. **Kortteenleeuwerik** (*Calandrella brachydactyla*), slechts één, maar mooie waarneming van deze soort, dit in de buurt van ons hotel in Alexandroupolis.

124. **Kalanderleeuwerik** (*Melanocorypha calandra*), enkele waarnemingen in en rond de Evros delta, algemeen in de omgeving van de zoutpannen van Porto Lagos.

125. **Oeverzwaluw** (*Riparia riparia*), vrijwel dagelijks gezien, waarschijnlijk vogels die daar blijkbaar massaal doortrekken.

126. **Boerenzwaluw** (*Hirundo rustica*), wat een aantallen, overal rondvliegende boerenzwaluwen! Het aantal vogels dat boven het Kerkinimeer vloog, was gewoonweg niet te schatten. Aan de diverse kusten die we bezochten, kwamen steeds grote hoeveelheden boerenzwaluwen laag over zee aan land gevlogen, dus nog duidelijk trek.

127. **Roodstuitzwaluw** (*Hirundo daurica*), algemeen, dagelijks meerdere exemplaren, zei het duidelijk minder in aantal dan de boerenzwaluw.

128. **Huiszwaluw** (*Delichon urbica*), algemeen in steden en dorpen.

129. **Witte kwikstaart** (*Motacilla alba*), een drietal waarnemingen verspreid over de reis, blijkbaar eerder zeldzaam daar als zomervogel.

130. **Gele kwikstaart** (*Motacilla flava*), slechts één zekere waarneming, waarschijnlijk een vogel op doortrek.

131. **Balkankwikstaart** (*Motacilla feldegg*), algemene broedvogel in de daartoe geschikte gebieden.

132. **Roodborst** (*Erithacus rubicula*), van deze thuis zo talrijke vogel slechts twee waarnemingen verspreid over gans de reis.

133. **Nachtegaal** (*Luscinia megarhynchos*), ongelofelijke aantallen, het was of er elke vijftig meter wel ergens een vogel zat te zingen.

134. **Noordse Nachtegaal** (*Luscinia luscinia*), waarschijnlijk meerdere waarnemingen in de vorm van zingende vogels. Eén zekere waarneming nabij ons hotel in de buurt van Alexandropoulis, waar elke morgen een vogel op de elektriciteitsdraden open en bloot zat te zingen.

135. **Zwarte roodstaart** (*Phoenicurus ochruros*), slechts één waarneming van een zingende vogel op de nok van een vervallen huis.

136. **Tapuit** (*Oenanthe oenanthe*), slechts twee, zei het langdurige waarnemingen van foeragerende vogels, beide waarnemingen in de buurt van de boomgrens.

137. **Oostelijke blonde tapuit** (*Oenanthe melanoleuca*), één waarneming in de buurt van Dadia forest. Waarschijnlijk was het merendeel van deze vogels nog niet terug uit de overwinteringsgebieden.

138. **Roodborsttapuit** (*Saxicola rubicola*), ook van deze soort slechts twee waarnemingen, eenmaal in de buurt van de Nestos delta, een op de top van Mount Vrontou.

139. **Blauwe rotslijster** (*Monticola solitarius*), één waarneming in een overigens uitgestrekt erg geschikt biotoop, dit bovenop de top van Mount Vrontou.

140. **Zanglijster** (*Turdus philomelos*), sporadisch waargenomen gedurende de ganse tocht, meestal zingende vogels.
141. **Grote lijster** (*Turdus viscivorus*), slechts enkele sporadische waarnemingen gedurende de reis.
142. **Merel** (*Turdus merula*), algemene soort, wel opvallend veel minder in tuinen, dorpen en steden als bij ons. Hier nog een echte bosvogel!
143. **Sperwergrasmus** (*Sylvia nisoria*), één waarneming van een zingende vogel in de buurt van Dadia. Waarschijnlijk was het gros van deze vogels nog niet terug uit de winterkwartieren.
144. **Zwartkop** (*Sylvia atricapilla*), eigenaardig genoeg enkel waargenomen op het einde van de reis, één zingende vogel nabij het Kerkinimeer, maar duidelijk meer zingende vogels in de buurt van en in Thessaloniki.
145. **Oostelijke orpheusgrasmus** (*Sylvia crassirostris*), één zangpost, dit in erg dicht struweel naast een zandpad in de buurt van de Evros delta. Ook deze vogels zijn toen vermoedelijk nog niet allemaal terug geweest uit de winterkwartieren.
146. **Braamsluiper** (*Sylvia curruca*), twee zangposten, eens in de buurt van de gierenvoederplaats in Dadia, eens onderweg naar Mount Vrontou.
147. **Kleine zwartkop** (*Sylvia melanocephala*) twee zangposten in de buurt van het Kerkinimeer, één in de buurt van ons hotel, en ander nabij Kalohori.
148. **Grasmus** (*Sylvia communis*), vrijwel overal in de geschikte biotopen waargenomen.
149. **Rietzanger** (*Acrocephalus schoenobaenus*), blijkbaar een vrij zeldzame soort hier, slechts één zangpost in de buurt van het Kerkinimeer.
150. **Grazzanger** (*Cisticola juncidis*), enkel waargenomen in de omgeving van de zoutpannen te Porto Lagos, maar daar wel zeer algemeen.
151. **Cetti's zanger** (*Cettia cetti*), zeer algemeen, overal te vinden waar wat water aanwezig.
152. **Kleine karekiet** (*Acrocephalus scirpaceus*), tegenvallende aantallen, enkel redelijk vertegenwoordigd in en rond het Kerkinimeer. Waarschijnlijk was het overgrote deel niet terug uit het wintergebied.
153. **Grote karekiet** (*Acrocephalus arundinaceus*), zeer algemeen, voor onze normen onbegrijpelijk hoge aantallen, in de geschikte biotopen zat om de 30 meter wel een vogel luidkeels te zingen.
154. **Oostelijke vale spotvogel** (*Iduna pallida*), ongelofelijke aantallen, geen struikje naast de weg of er zat wel een vogel in te zingen.
155. **Balkan bergfluiter** (*Phylloscopus orientalis*), enkele zangposten tijdens wandelingen in de nabijheid van de gierenvoederplaats in Dadia en in de buurt van Mount Vrontou.
156. **Tjiftjaf** (*Phylloscopus collybia*), ook van deze bij ons algemene soort slecht twee waarnemingen, dit in Dadia en Mount Vrontou.

157. **Goudhaantje** (*Regulus regulus*), deze soort werd enkel waargenomen in de wat hoger gelegen gebieden, dus Dadia en Mount Vrontou.
158. **Grauwe vliegenvanger** (*Muscicapa striata*), vrij algemeen, waarnemingen op meerder plaatsen.
159. **Koolmees** (*Parus major*), algemene soort, zowel op het platte land als in stedelijke omgeving, overal waar te nemen.
160. **Zwarte mees** (*Parus ater*), blijkbaar zeldzaam, slechts één zangpost, dit in de omgeving van de kijkhut bij de gierenvoederplaats in Dadia.
161. **Pimpelmees** (*Parus caeruleus*), voor onze normen hier ongewoon zeldzaam, ook van deze soort maar één zangpost en ook deze waarneming gebeurde in de omgeving van de kijkhut nabij de gierenvoederplaats in Dadia.
162. **Glanskopmees** (*Parus palustris*), één mooie waarneming in de omgeving van het Kerkinimeer.
163. **Rouwmees** (*Parus lugubris*), ook van deze soort slechts één waarneming dit in de buurt van Kerkinidorp.
164. **Startmees** (*Aegithalos caudatus*), enkele keren waargenomen, dit telkens in de bossen rond Dadia.
165. **Buidelmees** (*Reniz pendulinus*), twee verschillende waarnemingen op één dag, deze in de buurt van het Kerkinimeer.
166. **Boomkruiper** (*Certhia brachydactyla*), tweemaal waargenomen eenmaal in de bossen nabij Dadia, eenmaal halverwege de top van Mount Vrontou.
167. **Grauwe klauwier** (*Lanius collurio*), dagelijks meerdere waarneming, vrij grote aantallen in de Evros delta. Algemene soort.
168. **Roodkopklauwier** (*Lanius senator*), vrij algemene soort, overal aanwezig in de geschikte gebieden.
169. **Maskerklauwier** (*Lanius nubicus*), slechts op één plaats, (punt 63) in de buurt van Dadia, daar waarschijnlijk 3 koppels aanwezig. Op deze plaats werden alle vier de hier voorkomende soorten klauwieren gezien.
170. **Klapekster** (*Lanius excubitor*), deze in dit land normaal niet voorkomende soort werd duidelijk gadeslagen in het kaal rotsachtig gebied bovenop Mount Vrontou.
171. **Kleine klapekster** (*Lanius minor*), waarschijnlijk de algemeenste klauwier hier, van de top van Mount Vrontou tot in de laagte van de Evros delta wel te vinden.
172. **Ekster** (*Pica pica*), zeer algemeen, dagelijks diverse waarnemingen.
173. **Gaai** (*Garulus glandarius*), algemeen, regelmatige waarnemingen.
174. **Kauw** (*Corvus monedula*), algemeen, dagelijks wel enkele waarnemingen.

175. **Russische kauw** (*Corvus monedula soemmerringii*), enkel waargenomen in de omgeving van de luchthaven, daar zeker niet zeldzaam. Deze ondersoort onderscheidt zich van de nominaat, door de duidelijke witachtige halsvlekken.
176. **Roek** (*Corvus frugilegus*), maar één waarneming, een overvliegende vogel in de buurt van de haven van Thessaloniki.
177. **Zwarte kraai** (*Corvus corone*), redelijk algemeen, alhoewel de verspreidingskaarten in de diverse vogelboeken deze soort hier als niet aanwezig beschouwen.
178. **Bonte kraai** (*Corvus cornix*), zeer algemeen.
179. **Raaf** (*Corvus corax*), slechts één waarneming, dit van twee overvliegende vogels in de nabijheid van ons hotel aan het Kerkinimeer.
180. **Spreeuw** (*Sturnus vulgaris*), algemeen, dagelijkse meerdere waarnemingen.
181. **Wielewaal** (*Oriolus oriolus*), ongelooflijk talrijk, overal waar er ook maar enkele canadabomen bij elkaar stonden was de roep niet uit de lucht.
182. **Huismus** (*Passer domesticus*), zeer algemeen.
183. **Spaanse mus** (*Passer hispaniolensis*), vrij regelmatig waargenomen, in de buurt van de Evros delta waren de aantallen echt niet te overzien. Voor en achter onze stilstaande auto vlogen duizenden vogels voortdurend heen en weer om nest materiaal te verzamelen.
184. **Ringmus** (*Passer montanus*), enkele vogels gespot in de buurt van het Kerkinimeer.
185. **Vink** (*Fringilla coelebs*), veel minder algemeen als in onze contreien, hier en daar een zingende vogel en dat zelfs niet elke dag.
186. **Kneu** (*Carduelis cannabina*), slecht één waarneming, een zingende vogel, dit tijdens de afdaling van de Mount Vrontou.
187. **Putter** (*Carduelis carduelis*), vrijwel dagelijkse waarnemingen, soms in vrij grote groepen, wat deed vermoeden dat de soort nog doortrok.
188. **Groenling** (*Chloris chloris*), algemeen, vrijwel overal waar te nemen.
189. **Europese kanarie** (*Serinus serinus*), slechts één waarneming, dit onderweg naar Mount Vrontou, waar een op een elektriciteitsdraad zittende vogel luid zat te zingen.
190. **Appelvink** (*Coccothraustes coccothraustes*), één exemplaar op dezelfde plaats waar de Europese kanarie werd gezien.
191. **Rietgors** (*Emberiza schoeniclus*), enkele waarnemingen van zingende vogels, vrijwel al deze waarnemingen in de omgeving van het Kerkinimeer.
192. **Ortolaan** (*Emberiza hortulana*), ook van deze soort maar één, zei het mooie waarneming, dit in de buurt van Dadia forest.

193. **Geelgors** (*Emberiza citrinella*), blijkbaar zeer zeldzame soort, hier enkel aanwezig als wintergast, ook slechts één waarneming in de buurt van de Evros delta.

194. **Cirlgors** (*Emberiza cirius*), vervangt hier de geelgors, algemeen en overal wel waar te nemen.

195. **Zwartkopgors** (*Emberiza melanocephala*), algemeen, overal waar wat struiken de weg afzomen zat er wel één of meerdere exemplaren te zingen. In het begin van de reis werden nog vrij grote groepen gezien, duidelijk nog doortrek.

196. **Grauwe gors** (*Miliaria calandra*), zeer algemeen, overal waar velden aanwezig wel te spotten.

Jos Volders